

REABILITAÇÃO PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS DE 04 A 12 ANOS NO MUNICÍPIO DE BARUERI – SP

¹HASHIMOTO E.M., ¹MARIANO I.A., ¹FERREIRA A.P., ¹SOUSA A.S., ¹SANTOS J.S., ²CORRÊA F.H.

¹GRB – Grêmio Recreativo Barueri – Barueri, SP, Brasil

²SDPD – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Barueri, SP, Brasil

Introdução: Crianças com deficiência possuem inúmeras dificuldades psicomotoras, como por exemplo baixa autoestima, dificuldades de relacionamento e interação social, dificuldades com o controle tônico-postural, equilíbrio, entre outros, devendo ser estimuladas o quanto antes. A psicomotricidade uma ciência que estuda a interação do homem com o meio é uma possibilidade de auxílio no desenvolvimento das pessoas com deficiência. **Objetivo:** A reabilitação psicomotora vem como ferramenta para potencializar e estimular o desenvolvimento dos aspectos biopsicossociais, favorecendo as aprendizagens tanto no aspecto escolar, quanto esportivo, autonomia, autoestima, qualidade de vida e social. **Metodologia:** São atendidas no momento, 11 indivíduos, que possuem as seguintes deficiências: autismo, paralisia cerebral e deficiência intelectual com idades entre 4 a 12 anos. Iniciamos o processo com uma entrevista/anamnese com a família e avaliação psicomotora de ALVES, onde identificamos quais são os elementos psicomotores com maior atraso ou prejuízo e as maiores queixas e dificuldades tanto na escola quanto no ambiente familiar. Após esta avaliação encaminhamos os alunos para grupos com até 5 crianças, com necessidades relativamente semelhantes, onde estimulamos através de pequenos jogos, brincadeiras circuitos e atividades individuais. As sessões possuem duração de 45 minutos, 1 vez por semana. **Resultados:** Identificamos inicialmente que cerca de 90% dos atendidos apresentavam maior dificuldade no controle tônico-postural, equilíbrio e dispraxia. Os demais elementos também apresentavam dificuldades, porém entendemos que para haver melhora em outros aspectos, temos que melhorar o desempenho nos elementos base da psicomotricidade. Cerca de 70% apresentavam baixa interação social. Após 8 meses de atividades, identificamos uma melhora significativa na interação social, autoestima e autonomia, apresentaram melhora de aproximadamente 45% tonicidade e equilíbrio. **Considerações Finais:** A reabilitação motora, em conjunto com a família e demais atividades, contribui para a melhoria de desempenho dos assistidos, levando em consideração a avaliação e observação inicial e final até o presente momento.

Palavras-chave: reabilitação psicomotora; deficiência; autismo; deficiência intelectual; paralisia cerebral;