

PERFIL SOMATOTÍPICO DOS ATLETAS DA SELEÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL INFANTO-JUVENIL MASCULINO E FEMININO

Nayara Elis Cabral Pontes¹, Leonardo dos Santos Oliveira¹, Maria do Socorro Cirilo de Sousa¹, Péricles Paes Barreto Correia¹, Gilmário Ricarte Batista². 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

O objetivo desse presente estudo foi analisar a somatotipia de atletas de voleibol da Seleção Paraibana Infanto-juvenil. A amostra (n=23) foi composta por atletas da seleção paraibana de voleibol masculina ($16,8 \pm 0,40$) e do feminino ($15,5 \pm 0,67$). O método utilizado na avaliação do somatotipo foi o de Heath e Carter (1990). Os resultados do estudo apresentaram os seguintes valores de endomorfia, mesomorfia e ectomorfia (4,6-2,9-3,7) para a seleção masculina e (5,3-2,6-2,6) para o feminino. As características antropométricas e do somatotipo neste estudo foram elevados níveis no componente endomorfia, o que pode representar níveis elevados de gordura corporal, conseqüentemente pode significar níveis não adequados para as características morfológicas para o voleibol.

Palavras-chave: somatotipo, voleibol e talento esportivo.